

PREVENCE –

OBECNÉ POZNÁMKY

PREVENCE

- ✘ Předcházení chorobných stavů
- ✘ Filosofie přístupu k nemocnému a zdravotnické politice vůbec
- ✘ Nezbytná součást pracovní náplně každého zdravotnického pracovníka

PREVENTIVNÍ AUDIOLOGIE

- ✘ Se zabývá vyšetřování pacientů s cílem odhalit poškození sluchu a možnosti předcházet poruchám sluchu
 - + Prevence nespecifická
 - + Prevence specifická

PREVENTIVNÍ AUDIOLOGIE

✘ Se zabývá vyšetřování pacientů s cílem odhalit poškození sluchu a možností předcházet poruchám sluchu v době, kdy nejsou komunikační potíže

+ Prevence nespecifická:

Ekonomická, právní, sociální, zdravotnická a výchovná opatření společnosti i jejích složek, zaměřené na vytváření a ochranu zdravých životních a pracovních podmínek

PREVENTIVNÍ AUDIOLOGIE

+ Prevence specifická

- × a) primární prevence: zabránit vzniku choroby
*nevytvářet zdravotní rizika, mít zdravou populaci,
nezatěžovat riziky*
- × b) sekundární prevence
*co nejrychlejší nalezení poškození a zamezení
dalšího poškození zdraví*
- × c) terciální prevence
minimalizovat následky poruchy zdraví

PREVENTIVNÍ AUDIOLOGIE

× Různé skupiny zájmu:

- + Podle věku: děti = vrozené vady sluchu
 - × dospělí – hodnocení způsobilosti
 - × senioři – sluchové vady
- + Podle zaměstnání
 - × rizika hluku
 - × vibrací apod
- + Podle zdravotního stavu
 - × Po opakovaných středoušních zánětech
 - × Po infekčních chorobách dětského věku
 - × U mentálních poruch
 - × Po ušních operacích
 - × Vertigo, tinnitus atd.

DĚTI = VROZENÉ VADY SLUCHU

- ✘ 1) primární prevence (spíše mimo audio)
 - + *Výchova ke zdravému a plánovanému těhotenství. Sledování rizikových těhotenství. Sledování těhotenství u sluchově postižených rodičů. Péče o těhotné. Snižování rizika infekčních chorob těhotných. Praenatální diagnostika vrozených vad a poškození plodu.*
- ✘ 2) sekundární
- ✘ 3) terciální

DĚTI = VROZENÉ VADY SLUCHU

- × 1) primární prevence (spíše mimo audio)
- × 2) sekundární
 - + *Plošný screening*
 - + *Nalezení a zachycení sluchových vad u dětí zdravě narozených a u dětí rizikových skupin:*
 - × Děti sluchově postižených rodičů
 - × Po infekčních chorobách matky v graviditě
 - × Po infekčních chorobách v prvních letech života dítěte
 - × Po aktino – či chemoterapii
 - × Po úrazech hlavy
 - × S nižší porodní váhou než 1,500g
 - × S vrozenými vadami hlavy a uší
 - × S mnohočetnými vrozenými vadami
- × 3) terciální

DĚTI = VROZENÉ VADY SLUCHU

- × 1) primární prevence (spíše mimo audio)
- × 2) sekundární
- × 3) terciální
 - + *Přidělení sluchadel, edukace řeči, CI.*
 - + *Přesná a časná diagnostika; správná sluchadla a jejich nastavení. Intenzivní vývoj předřečových dovedností. Výchova k preferenci řeči.*

DOSPĚLÍ

× 1) primární prevence

+ *Všechny činnosti, které omezují vliv faktorů, které se podílejí na vzniku vad a poruch sluchu.*

- × Hluk
- × Nikotin
- × Toxiny
- × Úrazy hlavy a uší

× 2) sekundární

× 3) terciální

DOSPĚLÍ

- × 1) primární prevence
- × 2) sekundární
 - + *Pravidelné prohlídky všech rizikových skupin – hluk, střelba, ŘP apod.*
- × 3) terciální

DOSPĚLÍ

- × 1) primární prevence
- × 2) sekundární
- × 3) terciální
 - + *Přidělení sluchadel.*
 - + *Zlepšení komunikačních schopností.*

x Konec